

Vedle názvu granuloma inguinale se můžete setkat i s názvem Granuloma venereum, donovanosis.

**Granuloma inguinale** je vleklá bakteriální pohlavní nemoc, pomalu se rozvíjející, postihující kůži a podkoží genitálií a přilehlých oblastí. Vyskytuje se hlavně v tropech a subtropích (Jižní Indie, Čína, Nová Guinea, severní Austrálie, střední Afrika a jižní Amerika). Migrací obyvatel jsou hlášeny případy v USA, Velké Británii, ale též v kontinentální Evropě. U nás se běžně nevyskytuje, ale patří k nemocem podléhajícím zákonným opatřením.

**Původcem** je bakterie Calymmatobacterium (neboli Donovania) granulomatis velikosti 1,5 x 0,7 um, uložená vefagocytujících mononukleárech jako "Donovanova tělíska".

**Přenos infekce:** sexuálním stykem u osob s nízkým stupněm hygieny a vysokou promiskuitou. Infekciozita je poměrně malá, původce se vyskytuje v endemických oblastech jako střevní parazit.

**Inkubační doba** je 1 – 10 týdnů.

**Příznaky:** jako nebolestivý pupínek velikosti 5 - 15 mm lokalizovaný většinou na zevních genitáliích. U mužů na žaludu a předkožce. Primární ložisko se pomalu zvětšuje a během několika dnů snadno praskne a krvácí a mění se ve vřed se zahrnutými nebo převíslými okraji. Spodina vředu se později vyplňuje typickými granulacemi v barvě hovězího masa. Nehojící se vřed se dále šíří, mnohdy podkožně, u mužů do třísel, u žen k řitnímu otvoru. U homosexuálů je běžné postižení řitě. Podkožní uzlíky snadno prasknou a krvácí, což je typické právě pro toto onemocnění.

Onemocnění nepostihuje tříselné uzliny, může však napodobovat bubony a jiná onemocnění.

Neléčena způsobuje těžké následky, rozrušení penisu, uzávěr močové trubice.

**Prevence:** Neexistuje žádná ochranná metoda, která by chránila proti tomuto onemocnění. Jakmile zjistíte na genitálu nebo v tříslech jakékoliv projevy, navštivte lékaře.